



РАСТЕНИЕ

Форма роста	Полупрямостоячая
Тип роста	Промежуточный
Высота	Низкой высоты до средней
Развитие в начальной стадии	Быстрое
Окраска цветка	Светлая красно-фиолетовая
Количество клубней, шт.	12-14

СВОЙСТВА КЛУБНЕЙ

Цвет конюры	Жёлтый
Структура конюры	Гладкая, сетчатая
Цвет мякоти	Кремовый
Форма клубней	Овальная, удлинённо-овальная
Глубина глазков	Средняя, поверхностная
Период покоя	Длительный

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Нематода	Ro 1									
	Race 1*									
Рак картофеля	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фитофтороз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ризиктониоз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Чёрная ножка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Парша обыкновенная	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вторичный рост	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Парша серебристая	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Механические повреждения	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Появление чёрных пятен (bruising)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y-вирус	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Засухоустойчивость	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Оказался устойчивым в одной стране ЕС
Оценка в баллах: 0 – очень чувствителен, 10 – высокоустойчив

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Назначение	Столовый, картофель-фри	Содержание крахмала, %	14 – 16
Дней от всходов	85 – 90	Потемнение при варке	Незначительное
Урожайность, т/га	50 – 65	Потемнение мякоти	Незначительное
		Вкусовые качества	Отличные, кулинарный тип В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Подготовка к посадке:

Обязательно протравливание против ризиктониоза. Сортировку (подготовку к посадке) возможно производить только незадолго до посадки, примерно за 2 недели.

Не обламывать ростки! Посадка в прогретую почву.

Густота посадки, фракция 35–55 мм, шт/га: 33 000 – 38 000

Глубина посадки: На 1–2 см глубже, чем обычная

Доза внесения удобрений, кг д.в./га (для среднеобеспеченных почв):
N180, P130, K260

Чувствительность к гербицидам при внесении по всходам:
Чувствителен к метрибузину

Особенности уборки: Бережная

Другие особенности:

После уборки картофель необходимо быстро высушить. Перед сортировкой клубни необходимо прогреть до 8–10 °С

Зарегистрированы в Госреестрах:
Россия, Узбекистан